

Mirexan[®]

KARTA OSTRZEŻEŃ DLA PACJENTA OTRZYMUJĄCEGO PRODUKT LECZNICZY MIREXAN

Dabigatran

- Zawsze miej tę kartę przy sobie
- Upewnij się, że używasz najnowszej wersji karty

Drogi Pacjencie,

Lekarz rozpoczął leczenie eteksylanem dabigatranu. Aby bezpiecznie stosować ten lek, weź pod uwagę ważne informacje zawarte w środku. Ponieważ niniejsza karta ostrzeżeń dla pacjenta zawiera ważne informacje na temat leczenia, należy zawsze mieć ją przy sobie, aby poinformować personel medyczny o przyjmowaniu dabigatranu.

Informacje dla pacjenta dotyczące stosowania dabigatranu

Podczas przyjmowania leku Mirexan należy przestrzegać zaleceń lekarza.

- Dabigatran sprawia, że krew jest mniej „lepka”, zapobiega tworzeniu się skrzepów i zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru lub innych powikłań.
- Może to jednak zwiększyć ryzyko krwawienia.
- W przypadku wystąpienia krwawienia, które nie ustępuje samoistnie, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. W przypadku krwawienia, przed zaprzestaniem przyjmowania dabigatranu należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli upadniesz lub zranisz się podczas leczenia lekiem Mirexan, zwłaszcza jeśli uderzysz się w głowę, natychmiast zgłoś się po pomoc medyczną. Może być konieczne zbadanie przez lekarza, ponieważ możesz mieć zwiększone ryzyko krwawienia.
- Oznakami i objawami krwawień mogą być krwiaki skórne, smoliste stolce, krew w moczu, krwawienie z nosa itp.
- Jeśli konieczne jest wykonanie zabiegów chirurgicznych lub inwazyjnych zabiegów, przed zabiegiem poinformuj lekarza prowadzącego o przyjmowaniu leku.
- Nie należy przerywać przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem.
- Lek przyjmuj regularnie zgodnie z zaleceniami i nie pomiń żadnej dawki.
- Poinformuj swojego lekarza o wszystkich aktualnie przyjmowanych lekach.
- Dabigatran można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Kapsułkę należy połykać w całości, popijając szklaną wodę. Nie należy łamać, nie żuć ani nie wyciągać peletek z kapsułki, ponieważ może to zwiększyć ryzyko krwawienia.

Informacje dotyczące dabigatranu dla pracowników służby zdrowia

Dabigatran to doustny lek przeciwzakrzepowy działający poprzez bezpośrednie hamowanie trombiny.

W przypadku zabiegu chirurgicznego lub innego inwazyjnego zabiegu należy wcześniej przerwać stosowanie tego leku (szczegółowe informacje znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego).

W przypadku poważnych krwawień należy natychmiast przerwać stosowanie leku.

Ponieważ dabigatran wydalany jest głównie przez nerki, konieczne jest utrzymanie odpowiedniej diurezy. Może być usuwany z organizmu na drodze dializy.

Dostępny jest specyficzny środek odwracający działanie (Praxbind, idarucizumab) (szczegóły i dodatkowe porady dotyczące odwracania działania przeciwzakrzepowego dabigatranu, patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego Praxbind).

Proszę wypełnić tę sekcję lub poprosić o to swojego lekarza.

Informacja o pacjencie

Imię i nazwisko pacjenta

Data urodzenia

Wskazanie do antykoagulacji

Dawkowanie leku Mirexan